

# Influence™ LC

Fongicide

## Biofongicide homologué pour la suppression du blanc sur le Cannabis

Cannabis en serre

### CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES


- ✓ **Aucun délai** avant récolte, permettant ainsi de conserver le contrôle de la maladie et la qualité de la récolte
- ✓ **Un délai de réentrée minimal**, lorsque le produit est sec
- ✓ **Sécuritaire** pour les organismes bénéfiques et les pollinisateurs \*
- ✓ **Peu de risque** de développement de résistance
- ✓ **S'intègre parfaitement** à votre programme de lutte intégrée

\* Sécuritaire pour les organismes bénéfiques et les pollinisateurs lorsque le produit est utilisé conformément au mode d'emploi de l'étiquette.



### MODE D'ACTION

Après le traitement, les conidies et le mycélium du champignon pathogène sur la surface des feuilles sont plasmolysés et desséchés.



Mise à jour : 21/10/2017

# Influence™ LC

CULTURE	INSECTE	TAUX D'APPLICATION	VOLUME DE PULVÉRISATION	INTERVALLE D'APPLICATION
Cannabis (marihuana) produit commercialement à l'intérieur	Blanc	1,8% (v/v) Max 170 ml/1000pi <sup>2</sup>	Appliquer dans une quantité suffisante d'eau afin d'assurer une couverture complète du feuillage. Utiliser un minimum de 300 L/ha avec un pulvérisateur hydraulique.	Appliquer dès les premiers signes de la maladie. Répéter à intervalle de 7 - 10 jours selon la pression de la maladie.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Matière active :** Ail

**Emballage :** Une (1) caisse = 2 x 10L, aussi disponible dans des plus petits contenants à partir de 500 ml

**Formulation :** Liquide concentré

**Groupe chimique :** S/O Biopesticide

**Délai avant récolte :** 0 jour

**Délai de réentrée :** Lorsque le produit est sec



Influence LC est homologué au Canada pour AEF Global inc. Prière de se référer à l'étiquette du produit pour les détails complets concernant l'application. Toujours lire et suivre les informations fournies sur l'étiquette. Aller au [www.aefglobal.com](http://www.aefglobal.com) pour une information complète sur le produit.